


## 2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

 2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli


### Indice della lezione

#### 1. Perché i Numeri?

- Numeri razionali e retta
- $\sqrt{2}$  non è razionale
- Numeri reali e retta

#### 2. Intervalli

- intervalli limitati
- intervalli illimitati

 2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Perche' i numeri

I numeri sono un'astrazione del processo di contare  
Ma nella vita non solo contare ... misurare delle  
quantita' (lunghezza, aree, pesi, tempo, ...)

problema di contare  
e  
problema di misurare


Algebra e Geometria

 2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Perche' $\mathbb{Q}$ ?

- ALGEBRA: Per fare inverso del prodotto
- GEOMETRIA: Per misurare con le frazioni (principio di generalizzazione)

Ma allora  $\mathbb{Q}$  basta per misurare?


 2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Rappresentazione grafica di una retta

**r retta orientata:** r retta sulla quale è stato fissato un senso indicato dalla freccia

**percorrere r in senso positivo:** percorrere r nel senso della freccia

**O origine di r:** punto che divide r in due semirette: la semiretta positiva è quella che partendo da O viene percorsa in senso positivo, negativa l'altra



2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## I numeri razionali ed i punti di una retta

**Vediamo la relazione che possiamo creare tra i numeri razionali ed una retta**

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli


## I numeri razionali ed i punti di una retta

Consideriamo l'insieme dei numeri razionali  $\mathbb{Q}$  e l'insieme dei punti di una retta orientata  $r$  di origine  $O$

Prendiamo un segmento arbitrario  $u$  come unità di misura

E' possibile stabilire la seguente relazione tra  $\mathbb{Q}$  e i punti della retta:


ad ogni numero razionale  $q$  facciamo corrispondere un punto  $P$  della retta  $r$  la cui distanza da  $O$  abbia per misura (rispetto ad  $u$ ) il numero  $q$



2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## I numeri razionali ed i punti di una retta

Così, ad ogni numero razionale  $q$  corrisponde uno ed un solo punto  $P$  della retta  $r$ , **ma non è vero il viceversa**



2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## I numeri razionali ed i punti di una retta

La corrispondenza tra i numeri razionali ed i punti di una retta  $r$  del piano è

Univoca ( $Q$  è rappresentabile sulla retta)

Ma non biunivoca (la retta non rappresenta solo  $Q$ )


La non biunivocità di tale corrispondenza va dimostrata individuando almeno un punto della retta  $r$  al quale non corrisponde alcun numero razionale

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## I numeri razionali ed i punti di una retta

Ad esempio, non corrisponde ad alcun numero razionale il punto  $P$  in figura la cui distanza da  $O$  sulla retta  $r$  è pari alla diagonale del quadrato di lato unitario costruito sulla semiretta positiva di  $r$

La misura di tale diagonale è  $\sqrt{2}$



2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## $\sqrt{2}$ non è un numero razionale

Si può infatti dimostrare ragionando per "assurdo" che il numero reale  $\sqrt{2}$  non è un numero razionale:

**Teorema** : il numero reale  $\sqrt{2}$  non è razionale

## $\sqrt{2}$ non è un numero razionale: dimostrazione

**Teorema** : il numero reale  $\sqrt{2}$  non è razionale

Dimostrazione per assurdo:

Supponiamo che  $\sqrt{2}$  sia razionale.

$\sqrt{2} = m/n$  con  $m$  e  $n$  primi tra loro

$m^2/n^2 = 2 \Rightarrow m^2 = 2n^2 \Rightarrow m^2$  pari  $\Rightarrow m$  pari

$\Rightarrow m = 2k \Rightarrow m^2 = 4k^2$

$4k^2 = 2n^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2 \Rightarrow n^2$  pari  $\Rightarrow n$  pari

$m$  e  $n$  pari  $\rightarrow$  contraddizione che erano primi tra loro

ASSURDO

Esiste un numero che sta sulla retta ma non è razionale

## I numeri irrazionali

I numeri reali che non sono razionali sono detti **numeri irrazionali** (non si possono scrivere come frazioni ed hanno un numero illimitato di cifre decimali dopo la virgola)

$$\sqrt{2} = 1,4142\dots$$

$$\pi = 3,14\dots$$


$$e = 2,7182\dots$$

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## I numeri reali ed i punti di una retta

L'insieme **R** dei numeri reali può invece essere posto in corrispondenza biunivoca con i punti della retta  $r$ :

ad ogni numero reale  $x$  corrisponde un unico punto  $P$  della retta e viceversa



2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Insiemi infiniti\*

$$\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R}$$

Come facciamo a "contare" gli insiemi infiniti?

Due insiemi A e B si dicono di uguale **cardinalità (o potenza)** se possono essere messi in **corrispondenza biunivoca** tra loro (cioè una legge che associa ad ogni elemento di A uno ed uno solo elemento di B).

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## N e Z hanno la stessa cardinalità?

Z		N
0	$\leftrightarrow$	0
1	$\leftrightarrow$	1
-1	$\leftrightarrow$	2
2	$\leftrightarrow$	3
-2	$\leftrightarrow$	4
...	$\leftrightarrow$	...
n	$\leftrightarrow$	$2n-1$
-n	$\leftrightarrow$	$2n$

N e Z hanno la stessa cardinalità.  
La cardinalità di N e Z si dice del numerabile  $\aleph_0$

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Z e Q hanno la stessa cardinalità?

Si può dimostrare che anche Q è numerabile  
(cioè ha la cardinalità di N e Z)

## R ha la stessa cardinalità di Q?

Ed R?

Si può dimostrare che R non è numerabile.  
La cardinalità di R prende il nome di potenza del  
**continuo**.  $\aleph_1$

### **Ipotesi del continuo**


Non esiste nessun insieme la cui cardinalità è  
strettamente compresa fra quella dei numeri  
naturali e quella dei numeri reali.

## Intervalli: definizioni

Sono particolari insiemi numerici.

Dati due numeri reali  $a$  e  $b$ , con  $a, b \in \mathbb{R}$ , si definisce intervallo uno dei seguenti insiemi:

- intervallo chiuso  $[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$



- intervallo aperto  $]a,b[ = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$



2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Intervalli: definizioni

- intervallo chiuso a sinistra e aperto a destra

$$[a,b[ = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$



- intervallo aperto a sinistra e chiuso a destra

$$]a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$




2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli


## Intervalli limitati ed illimitati

Gli intervalli appena definiti sono limitati poiché ogni  $x$  appartenente all'intervallo varia tra due numeri finiti;  
Anche le semirette sono intervalli, ma intervalli illimitati

$$(-\infty; b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$$




$$(-\infty; b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$$




2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Intervalli illimitati

- $[a; +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$



- $(a; +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$



2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli


## Esercizi

Esercizio 1. Dati gli insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 4\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} : 3 \leq x \leq 8\}$$


calcolare  $A \cap B$

 2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Operazioni tra gli insiemi: intersezione

Def. Si definisce **intersezione** tra due insiemi A e B, l'insieme formato dagli elementi comuni ad A e B e si indica col simbolo

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$$

 2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Esercizi


Esercizio 1. Dati gli insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 4\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} : 3 \leq x \leq 8\}$$

calcolare  $A \cap B$

$u$   
|-----|



$$A \cap B = \{x \in \mathbb{R} : 3 \leq x < 4\}$$

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Esercizi

Esercizio 2. Dati gli insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < -1\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x \leq -2\}$$

calcolare  $A \cap B$

$$A \cap B = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x \leq -2\}$$

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Esercizi


Esercizio 3. Dati gli insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 8\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} : 3 \leq x \leq 7\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} : 1 < x < 6\}$$

calcolare  $(A \cap B) \cap C$



$$A \cap B \cap C = \{x \in \mathbb{N} : 3 \leq x \leq 5\} \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{N} : 2 < x < 6\}$$

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Esercizi

Esercizio 4. Dati gli insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq \sqrt{2}\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1,4\}$$

calcolare  $A - B$  e  $B - A$

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

## Differenza complementare

Def. Si definisce **differenza complementare** tra un insieme  $A$  ed un suo sottoinsieme  $B$ , l'insieme formato dagli elementi che appartengono ad  $A$  e non appartengono a  $B$  e si indica col simbolo

$$A - B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli


## Esercizi

Esercizio 4. Dati gli insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq \sqrt{2}\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1,4\}$$

calcolare  $A - B$  e  $B - A$



⇒

$$A - B = \emptyset$$
$$B - A = \{x \in \mathbb{R} : 1,4 \leq x < \sqrt{2}\}$$

2. Rappresentazione numeri reali retta. Intervalli

Esercizi file:

02es. Esercizi - Intervalli.pdf